

Endométriose au travail

“Santé des femmes”

8 janvier 2025 – Chaire Santé, vulnérabilité, territoires

Alice Romerio

Université Paris 8, Cresppa
alice.romerio02@univ-paris8.fr

L'endométriose

- Maladie connue depuis **1860** mais sous-étudiée et sous-diagnostiquée
 - **10%** des personnes menstruées sont atteintes en France
 - **Maladie chronique inflammatoire**
 - De **nombreux organes** peuvent être touchés y compris en dehors de la sphère gynécologique : utérus, ovaires, trompes de Fallope mais aussi intestins, vessie, vagin...
 - **Symptômes variés** : douleurs pelviennes, troubles digestifs et urinaires, fatigue chronique...pendant et/ou en dehors des règles
 - **Délai de diagnostic long** : en moyenne 7 ans après l'apparition des premiers symptômes
-

L'ENQUÊTE

- **QUESTIONNAIRE ENDOTRAVAIL**

Période : Février 2020

Échantillon : 1986 personnes

- **ENTRETIENS**

Entre février 2021 et septembre 2022

17 femmes


Diversité d'âge (26 à 44 ans) , statut d'emploi (CDI, CDD, contrat saisonnier, fonctionnaire, indépendante..), secteur d'activité (restauration, administration publique, banque, agriculture, santé, vente...)

QUESTIONNAIRE février 2020

ENDOMÉTRIOSE & TRAVAIL

étude des conséquences de l'endométriose sur la vie professionnelle et la précarité

endotravail.fr



L'endométriose au travail : diversité des symptômes incapacitants

Source enquête « Endotravail »

1667 participantes ont répondu à la question à choix multiples :
« Quels sont les symptômes de l'endométriose (ou des traitements éventuels) qui vous gênent au travail ? »

Karen
MESSING

GENRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Karine
BRIARD

1


Pénibilité des
métiers féminins

2

Normes
organisationnelles
genrées

3

Genre et
pression
temporelle



Le travail avec l'endométriose est rendu plus pénible